

恶性肿瘤院外特药清单

药品的使用需符合中国国家药品监督管理部门批准的
该药品说明书所列明的适应症及用法用量

序号	药品名	分子名
1	可瑞达	帕博利珠单抗
2	欧狄沃	纳武利尤单抗
3	乐卫玛	仑伐替尼
4	爱博新	哌柏西利
5	拓益	特瑞普利单抗
6	多泽润	达可替尼
7	艾瑞卡	卡瑞利珠单抗
8	兆珂	达雷妥尤单抗
9	安森珂	阿帕他胺
10	安圣莎	阿来替尼
11	利普卓	奥拉帕利
12	艾瑞妮	吡咯替尼
13	帕捷特	帕妥珠单抗
14	爱优特	呋喹替尼
15	达伯舒	信迪利单抗
16	亿珂	伊布替尼
17	佐博伏	维莫非尼
18	万珂	硼替佐米
19	昕泰	硼替佐米
20	千平	硼替佐米
21	齐普乐	硼替佐米
22	益久	硼替佐米
23	恩立施	硼替佐米
24	安维汀	贝伐珠单抗
25	安可达	贝伐珠单抗
26	格列卫	伊马替尼
27	诺利宁	伊马替尼
28	格尼可	伊马替尼
29	昕维	伊马替尼
30	瑞复美	来那度胺
31	立生	来那度胺
32	安显	来那度胺
33	齐普怡	来那度胺
34	多吉美	索拉非尼
35	爱必妥	西妥昔单抗

36	维全特	培唑帕尼
37	赞可达	塞瑞替尼
38	泽珂	阿比特龙
39	艾森特	阿比特龙
40	晴可舒	阿比特龙
41	欣杨	阿比特龙
42	拜万戈	瑞戈非尼
43	赛可瑞	克唑替尼
44	泰瑞沙	奥希替尼
45	恩莱瑞	伊沙佐米
46	泰欣生	尼妥珠单抗
47	恩度	重组人血管内皮抑制素
48	英立达	阿昔替尼
49	索坦	舒尼替尼
50	舒尼替尼胶囊	舒尼替尼
51	艾坦	阿帕替尼
52	施达赛	达沙替尼
53	依尼舒	达沙替尼
54	达希纳	尼洛替尼
55	美罗华	利妥昔单抗
56	汉利康	利妥昔单抗
57	泰立沙	拉帕替尼
58	爱谱沙	西达本胺
59	吉泰瑞	阿法替尼
60	赫赛汀	曲妥珠单抗
61	福可维	安罗替尼
62	飞尼妥	依维莫司
63	易瑞沙	吉非替尼
64	伊瑞可	吉非替尼
65	吉至	吉非替尼
66	科愈新	吉非替尼
67	凯美纳	埃克替尼
68	特罗凯	厄洛替尼
69	厄洛替尼片	厄洛替尼
70	豪森昕福	氟马替尼
71	安可坦	恩扎卢胺
72	泰菲乐	达拉非尼
73	迈吉宁	曲美替尼
74	则乐	尼拉帕利
75	英飞凡	度伐利尤单抗
76	百泽安	替雷利珠单抗
77	安加维	地舒单抗
78	捷恪卫	芦可替尼

79	利卡汀	美妥昔单抗
80	康士得	比卡鲁胺
81	朝晖先	比卡鲁胺
82	双益安	比卡鲁胺
83	海正	比卡鲁胺
84	岩列舒	比卡鲁胺
85	反映亭	沙利度胺
86	爱然	沙利度胺
87	普诺安	安立生坦
88	维首	阿扎胞苷
89	英可欣	泊那替尼
90	乐卫玛	伦伐替尼
91	乐唯欣	盐酸苯达莫司汀
92	赛普汀	伊尼妥单抗
93	晴唯可	地西他滨
94	恩利	依那西普
95	倍力腾	贝利尤单抗
96	唯择	阿贝西利
97	艾瑞利	阿得贝利单抗
98	凡瑞克	安立生坦
99	吉月	阿法替尼
100	汇昕	阿扎胞苷
101	多美素	盐酸多柔比星脂质体
102	芨仕得	氟维司群
103	阿美乐	甲磺酸阿美替尼
104	百悦泽	泽布替尼
105	立幸	盐酸多柔比星脂质体
106	存达	盐酸苯达莫司汀
107	拉司太特	依托泊苷
108	泰圣奇	阿替利珠单抗
109	爱斯万	替吉奥
110	宜诺凯	奥布替尼
111	拓舒沃	艾伏尼布
112	赫赛莱	恩美曲妥珠单抗
113	维达莎	阿扎胞苷
114	维康达	替吉奥
115	朗斯弗	曲氟尿苷替匹嘧啶
116	艾奕	替吉奥
117	注射用瑞利珠单抗	卡瑞利珠单抗
118	注射用硼替佐米	硼替佐米
119	达攸同	贝伐珠单抗
120	汉曲优	曲妥珠单抗
121	普吉华	普拉替尼胶囊

122	泰吉华	阿伐替尼片
123	奕凯达	阿基仑赛注射液
124	倍诺达	瑞基奥伦赛注射液

备注一：“奕凯达”及“倍诺达”药品适用于被保险人在等待期后经二级及二级以上的公立医院普通部初次确诊罹患恶性肿瘤-重度的情形，且单个保单年度内“奕凯达”、“倍诺达”药品累计可使用次数不超过1次。

备注二：药品适用症需符合中国国家药品监督管理局批准的该药品说明书中所列明的适应症和用法用量。

1) 奕凯达：用于治疗既往接受二线或以上系统性治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤（r/r LBCL）成人患者，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）非特指型（NOS）、原发纵隔大B细胞淋巴瘤（PMBCL）、高级别B细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤转化的DLBCL。用于治疗一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后12个月内复发的成人大B细胞淋巴瘤（r/r LBCL）。

2) 倍诺达：用于治疗经过二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤（r/r LBCL）；用于治疗经过二线或以上系统性治疗的成人难治性或24个月内复发的滤泡性淋巴瘤（r/r FL）。用于治疗经过二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤非特指型、滤泡性淋巴瘤转化的弥漫性大B细胞淋巴瘤、3b级滤泡性淋巴瘤、原发纵隔大B细胞淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤伴MYC和BCL-2和/或BCL-6重排（双打击/三打击淋巴瘤）。